

Efter ympningen böra växterna ställas på en skuggig plats, och, när ympen börjar växa, lossas bastbindningen, samt borttages helt och hållet, när han kommit i god växt.

b) *Oculering* företages helst i Augusti, och användes mest för Pomeransträd; men äfven för andra växter är den en god förädlingsmethod. Samma fordringar ligga till grund för denna som för ympning, endast i några delar skiljer sig denna operation derifrån. Oculering verkställes på följande sätt: Kronans grenar på grundstammen inskäras, och i barken på stammen, till den höjd man önskar densamma förädlad, göres en inskärning, som liknar ett latinskt T. Oculagen utskäres nu, såsom Fig. 11 utvisar, och måste från ögat vid bladets bas en fin trä-nerf quarsitta, om något lyckligt resultat skall kunna förväntas. Barken på grundstammen öppnas derefter på båda sidor om inskärningen, och oculagen inskjutes, såsom Fig. 12 utvisar, och omlindas med bast eller ullgarn, hvilket borttages så snart oculagen börjar att växa, hvarefter den förädlade individen behandlas såsom förut är nämnt vid ympning. Likväl måste den del af stammen, som sitter kvar ofvanom oculagen, straxt ofvanför densamma afskäras under följande året och såret bestrykas med ympvax.

10 §. Menniskosnillet har äfven förstått att genom *Hybridisering* eller *croisering* komma naturen till hjälp vid växternas befruktning, och har derigenom mångdubblat antalet af de växter, vi odla. Hybridiseringen verkställes vanligen mellan arter af samma slägte, och detta sker för att erhålla varieteter eller hybrida växter, som blifva olika till blom-