

A. chilensis, *W. H.* 2. H. Chili. (Äfven benämnd *Alstroemeria* du Chili). Bl. Som:r. Blom:r variera i alla färger, från hvitt till rosa, orange, zinober m. m. Bladen lansettlika, spetsade, vid basen något vridna.

A. Pelegrina, *L.* 2. H. Peru och Chili. Bl. Juni, Juli. Blom:r i kanten ljusröda, i svalget gula med röda fläckar. Bladen glatta, jemnbredt lansettlika, vridna.

A. psittacina, *Lhm.* 2. H. Mexico. Bl. Aug. Sept. Blom:r purpurröda, tecknade med mörkare fläckar. Bladen trubbigt lansettlika, glatta, något vridna.

Odling. Öfvervintras utan vattning vid en temperatur af 8—10° C. Omplanteras i Februari i temligen stora krukor i en jordblandning af 2 delar lerhaltig grästorfsjord, 1 del löfjord samt en $\frac{1}{4}$ sand. Utsättes under sommaren i fria luften. Förökas genom lökarnes delning vid omplanteringen, samt genom frön.

Amaryllis, *L.* Namnet på en nymph, besjungen af skalden Virgilius. *Hexandria*, *Monogynia*. — *Amaryllideæ*.

A. Belladonna, *L.* 2. H. Westind. Bl. Våren. Blom:r ljusröda. Bladen jemnbreda.

A. formosissima, *L.* 2. H. St Jago. Bl. Våren. Blom:r praktfulla, mörkt körsbärsröda, öfverströdda liksom med guldstoff. Bladen lansettlika, och framkomma sedan blomstängeln utvecklat sig.

A. Johnsonii, *Sweet.* 2. Bl. Våren. En hybrid af *Regina* och *vittata*. Blom:r körsbärsröda, med hvita strimmor. Bladen lansettlika. Denna art är en af de bästa till tidig odling.