

dragna i Holland, hvarifrån man erhåller de bästa rötter eller knölar.

*A. Japanica*, Siebol. 2. H. Japan. Bl. Som:r. Blom:r mörkt rosenröda. Bladen flikiga.

Odling. Öfvervintras i en källare eller kallt rum vid 4—6° C. utan vattning. Omplanteras i Augusti uti 1 del grästorfsjord, 1 del löfjord, 1 del kogödsel, samt  $\frac{1}{4}$  sand. Vattnas under sommaren måttligt, och kan då stå ute i fria luften på ett soligt ställe. Förökas genom frön samt genom delning af rötterna.

*Anthemis*, L. (*Matricaria*). I anseende till slägtets förmåga att florera rikt, af *anthe-mon*, blomma. *Syngenesia*, *Superflua*. — *Compositæ*.

*A. nobilis*, L. (*flore pleno*) 2. H. Europa. Bl. Juli—Nov. Blom:r hvita, dubbla, liknande Bellis. Bladen dubbelt parbladiga. Hela växten har en stark aromatisk lukt.

Odling. Öfvervintras vid 4—6° C. med måttlig vattning. Omplanteras i Augusti uti lika delar grästorfs- och löfjord, tillsatt med  $\frac{1}{2}$  del hästgödsel och sand. Kan under sommaren utplanteras i fria jorden och på hösten inslås i kruka. Förökas genom frön och sticklingar.

*Aotus*, Smith. Namnet är härleadt af *a*, beröfvande, och *ous*, öra, emedan blommornas öronlika bihang saknas. *Decandria*, *Monogynia*. — *Leguminosæ*, *Papilionaceæ*.

*A. gracillima*, Meisn. 5. H. N. Holl. Blom:r gula. Bladen små, jembreda.

*A. lanigera*, Cunnigh. 5. H. som föreg. Blom:r gula. Bladen jembreda.