

C. indica, L. 2. H. Ostind. Bl. Juli—Sept. Blom:r purpurröda. Bladen äggrunda, spetsiga.

C. limbata, Rosc. 2. H. Brasil. Bl. under nästan hela året. Blom:r skarlakansröda med gult. Bladen lansettformiga, spetsiga.

C. Warscewiczii, Hort. 2. H. Central-Amerika. Bl. Maj—Juli. Blom:r skarlakansröda. Bladen äggrunda, spetsade. Som ung planta försedd med bruna stripor på bladnerfverna.

Odling. Öfvervintras vid en värme af 15—18° C. med litet vatten. Understundom vissna några utaf bladstjelkarne bort under vintern. Dessa böra då afskäras och vattningen nästan upphöra. Omplanteringen företages i Mars uti 1 del grästorfsjord, 2 delar löfjord, 1 del hästgödsel samt $\frac{1}{4}$ sand. Utsättas under sommaren på ett varmt, soligt ställe. Förökas genom fränskiljning af rotskott, äfven genom frön; dessa likna perlor, hvaraf det allmänna Svenska namnet Perlväxt.

Capsicum, L. (Spansk peppar.) Så kallad af *kapto*, bita, i anseende till fröhusets skarpa och stickande egenskaper. *Pentandria*, *Monogynia*. — *Solanæ*.

C. annum, L. ☉. H. Mexico. Bl. Juli, Aug. Blom:r hvita. Bladen äggrundt lansettformiga. Frukten skönt glänsande, purpurröd, orangefärgad eller gul. Frukten, hvarför den egentligen odlas, har en skarp brännande smak.

Odling. Växten är ettårig; bör således för hvarje år uppdragas af frö. Dessa sås i Mars; plantorna omskolas samt planteras i slutet af Maj uti krukor om 6 tum diameter. Jorden bör bestå af 2 delar grästorfsjord, 1 del löfjord, 2 delar kogöd-