

C. hybridus, *H. Berol.* 2. Hybrid. Bl. Maj, Juni. Blom:r eldröda. Grenarna upprättstående, platta, vingade, understundom 3- 4-kantiga.

C. Jenkinsonii, *Sweet.* 2. Hybrid. Bl. Maj. Blom:r carminröda, skimrande i blått. Grenarna upprättstående 3- 4-kantiga, vingade.

C. triangularis, *Haw.* 2. H. Caraibiska öarna. Bl. Som:r. Blom:r stora, hvita med gult. Stam och grenar klängande, 3-kantiga.

Odling. Öfvervintras vid en temperatur af 15—18° C. Fordrar under vintermånaderna nästan intet vatten. Omplanteras hvartannat eller hvart tredje år efter slutad blomstring uti 1 del grästorfsjord, 3 delar löfjord, 1 del hästgödsel, $\frac{1}{2}$ del sand samt $\frac{1}{4}$ gammalt kalkgrus, tegelmjöl och träkol tillsammans. Krukorna tagas ej för stora, och förses i botten med ett godt underlag af skärfvor eller träkol. Kunna under sjelfva högsommaren utflyttas i fria luften på ett soligt och torrt ställe, samt vattnas måttligt. Förökas genom stieklingar, som vattnas sparsamt och först, innan de planteras, få ligga några dagar och torka.

Cheiranthus, *L.* (Lackviol) Härledt från dess Arabiska namn *kheyrey*, och *anthos*, blomma. *Tetradynamia*, *Siliquosæ*. — *Cruciferæ*.

C. Cheiri, *L.* 2. H. Frankrike och Spanien. Bl. Vår och Som:r. Blom:r i flera nyanser från gult till svartbrunt. Bladen lansettformiga, glänsande.

Odling. De dubbla varieteterna äro i synnerhet tjenliga att odla i rum; dessa förökas genom stieklingar, som kunna med fördel sättas nästan alla tider under våren och sommaren. De enkla deremot förökas genom frö, som sås i krukor, och se-