

jord, 1 del hästgödsel, 1 del kogödsel, samt $\frac{1}{4}$ sand. Efter omplanteringen kunna de, om vädret sådant tillåter, utsättas i fria luften på ett för morgonsolen liggande ställe; vattnas måttligt, tills de komma i växt, sedan mera. Exemplaren aftoppas, när de nått en höjd af 7 till 8 tum, hvarutaf de blifva greniga och buskiga. I slutet af Juli omplanteras de för andra gången uti 6 till 7 tums krukor, och uti ofvannämnda jordblandning. De kunna derefter flyttas till ett solrikare ställe, och på hösten gifvas 2 eller 3 gödselvattningar med 8 dagars mellanrum. Innan frostnätterna infinna sig, inflyttas de i ett svaltrum, och löna då vanligen med en rik blomstring odlarens möda.

Hybrider, som i synnerhet förtjena att odlas, äro, af de storblommiga, följande: *Anaxo, Beauty, Conductor, The Duke, Fleur de Marie, Grand Napoleon, Lady Humlock, Madam Ney, Magnet, Nec plus ultra, Orion, Prince Albert, Queen of Gipsies, Queen Victoria, Rose et Blanche*; af små dverg- eller Liliput-varieteter: *Argentine, Auguste Meillez, Bon ami, Circe, Daphne, Feu Fallet, Gold-Anemon, Grand Sultan, La Fiance, La Liliputi-enne, Madam Vetry, Monte Christo, Perfecta, Petit Poucet, Pompon bijou, Pompon d'or, Rose Pompon, Vitida* m. fl.

Cineraria, L. (Senecio). Af *cineres*, aska, hän-tydande på det mjuka, hvita dunet, som betäcker bladens undra yta. *Syngenesia, Superflua.* — *Compositæ, Senecionideæ.*

C. cruenta, L'Herit. 2. H. Teneriffa. Bl. våren. Blom:r purpurröda, välluktande. Bladen hjertformiga, något flikiga, mjukhåriga.