

C. Schiedeana, *Schlech.* 2. H. Mexico. Bl. Jan. Feb. Blom:r gula med brunröda fläckar. Bladen lansettformiga, mjukhåriga.

Odling. Öfvervintras vid 12—15° C., nästan utan vattning. Omplanteras efter slutad blomstring i början af April uti 1 del löfjord, 1 del grof ljungjord, $\frac{1}{4}$ förmultnad trä, samt $\frac{1}{4}$ sand, små krukskärfvor och träkol tillsammans. Under sommaren gifves rikt med vatten och skugg³ för brännande sol. Förökningen sker genom stickli^ugar, som sättas på våren under glasklocka i hälften sand och hälften ljungjord, och vattnas i början sparsamt.

Convallaria, *L.* Af det latinska ord t *convallis*, dal, däld, med hänseende till dess nat rliga växtlokal. *Hexandria*, *Monogynia*. — *Lil aceæ*.

C. majalis, *L.* 2. H. Europa. Bl. Maj, Juni. Blom:r klockformiga, hvita, hängande, välluktande. Bladen ovalt lansettlika, mörkgröna, glatta.

Denna vackra, för sitt anspråkslösa utseende och behagliga vällukt allmänt omtyckta planta förtjenar, mera än hvad nu sker, odlas både i trädgårdar och i kruka. Man kan för detta ändamål använda den vildt växande; dock är en varietet af denna, benämnd *C. majalis major*, mera att rekommendera för sina större blommor och starkare växt. Flera varieteter finnas äfven, såsom med röda och dubbla hvita blommor; dock blomstra dessa mera sparsamt, och äro således för odling i kruka nästan opassande.

Odling. Rötter, tjenliga till odling i kruka, införskrifvas vanligen från Tyskland. Detta är dock ett besvär, som vi mycket väl kunde undvika, om vi förskaffade oss den förutnämnde *C. majalis var.*