

Flera sköna arter och varieteter finnas, såsom: *ampullacea*, *Lindlejana*, *pallida*, *rosea major*, *rubra elegans*, *Stockwelliana*, *tricolor*, m. fl.

Odling. Se *Aotus*.

Cotyledon, L. Af *cotyle*, hålighet, emedan många arter hafva liksom urhålkade blad. *Decandria*, *Pentandria*. — *Sempervivæ*.

C. coruscans, *Haw.* 2, H. Cap. Bl. Juni, Juli. Blom:r hängande, röda. Bladen kilformiga, saftiga.

C. jasminiflora, *Salm.* 2, H. Cap. Bl. Som:r. Blom:r hvita med rödt. Bladen nästan runda, saftiga.

C. purpurea, *Thunb.* 2, H. Cap. Bl. Som:r. Blom:r purpurröda. Bladen jemnbreda, saftiga.

Odling. Öfvervintras vid 12—15° C. med obetydlig vattning. Omplanteras i Mars uti 2 delar löfjord, 1 del grästorfsjord, $\frac{1}{2}$ del hästgödsel, $\frac{1}{2}$ del sand och $\frac{1}{4}$ sönderslagna krukskärfvor. Krukorna tagas ej för stora, och i botten lägges ett godt skärf-underlag. Vattnas under sommaren måttligt, och hållas gerna hela året under glas. Förökas genom sticklingar, äfven genom bladen med sina skaft, som lätt fatta rötter, om de sättas i hälften jord och hälften sand, under glasklocka, och vattnas sparsamt i början.

Crassula, L. Ett diminutivum af *crassus*, tjock, häntydande på bladens och stammens köttaktiga beståndsdelar. *Pentandria*, *Monogynia*. — *Crasulaceæ*.

C. arborescens, *Willd.* 3, H. Cap. Bl. Juni, Juli. Blom:r först hvita, sedan rosenröda. Bladen rundade, saftiga.