

*C. argentea*, L. 2. H. Cap. Bl. Som:r. Blom:r hvita, med svarta ståndarknappar. Bladen äggrunda, saftiga.

*C. spathulata*, Thunb. 2. H. Cap. Bl. Juni, —Nov. Blom:r vackra, köttfärgade. Bladen äggrunda, saftiga. Passande till hängväxt i ampelkrukor.

Odling. Se *Aloë*. Förökas genom sticklingar, som planteras i hälften löfjord och hälften sand, och sätts under glasklocka, samt vattnas sparsamt; äfven genom frön.

*Crinum*, L. Af *krinon*, det Grekiska namnet på denna liljeväxt. *Hexandria*, *Monogynia*. — *Amaryllideae*.

*C. amabile*, Don. 2. H. Sumatra. Bl. olika årstider. Blom:r praktfulla, välluktande, purpuröda med hvitt. Bladen jemnbredt lansettformiga, glatta. En utaf våra praktfullaste lökväxter.

*C. Americanum*, L. 2. H. Syd-Amerika. Bl. Som:r. Blom:r hvita, välluktande. Bladen jemnbreda, rännformiga.

*C. cruentum*, Ker. 2. H. Ostind. Bl. olika årstider. Blom:r rosa-purpuröda. Blad som föregående, något hängande.

*C. scabrum*, Sims. 2. H. Brasil. Bl. Juni, Juli. Blom:r hvita med röda strimmor, välluktande. Bladen jemnbreda, mot ändarne spetsade, något hängande.

Odling. Kunna öfvervintras bakför andra växter vid 6—10° C. utan vattning. Omplanteras i Mars uti 2 delar grästorfsjord, 2 delar löfjord, 1 del kogödsel och 1 del sand. Fordra godt utrymme för sina rötter, hvarför krukorna tagas stora, och