

gelbundet utväxa från stammen. *Monæcia*, *Monadelphia*. — *Coniferæ*.

*C. Australis*, Pers. †. H. N. Holl. Blom:r obetydliga. Bladen jemnbreda, tryckta mot grenarna. Hela släktet utgöres af utmärkt vackra, alltid gröna växter.

*C. funebris*, Endl. †. H. China. Blom:r obetydliga. Bladen kilformiga, taktegelmässigt liggande mot stam och grenar, de sednare hängande.

*C. sempervirens*, L. †. H. Södra Europa. Denna, under namn af Cypress, allmänt förekommande växt, har alltid ansetts såsom ett sorgens symbol, och begagnades hos de gamla på grafvar.

*C. torulosa*, Don. †. H. Nepal. Blom:r obetydliga. Bladen äggrunda, convexa, tryckta mot grenarna.

Odling. Se *Araucaria*. Förökas genom frö, äfven genom sticklingar och afläggare.

*Curculigo*, Gaert. Härledt från *curculio*, kornmask, emedan fröen under en viss process likna denna insekts tryne. *Hexandria*, *Monogynia*. — *Asphodeleæ*.

*C. recurvata*, Dryand. †. H. Java. Bl. Som:r. Blom:r gula och obetydliga. Bladen deremot utmärkt sköna, lansettformiga, mot båda ändar spetsiga; hela bladet vackert veckadt.

Odling. Öfvervintras vid 15—18° C. och måttlig vattning. Omplanteras i Mars uti 2 delar grästorfsjord, 1 del löfjord, 1 del hästgödsel och  $\frac{1}{4}$  sand. Den fordrar godt utrymme för sina rötter. Kan ej under sommaren utsättas i fria luften, emedan bladen lätt afbrytas af vinden. Vattnas under som-