

D. odora, Thunb. †. H. China, Japan. Bl. Mars, April. Blom: r ljusröda, välluktande. Bladen lansettformiga, glatta.

Odling. De tre förstnämnde arterna övervintras frostfritt vid 2—4° C. utan vattning; de öfriga vid 8—10° C. och måttlig vattning. Omplanteras i Mars, och de som då blomstra, efter slutad florering, uti 2 delar ljungjord, $\frac{1}{2}$ del grästorfsjord, 1 del löfjord och $\frac{1}{2}$ sand. I krukorna lägges ett godt underlag af skärfvor och kol. Utsätts under sommaren i fria luften på ett mot middagssolen skyddadt ställe, och vattnas måttligt. Förökas genom ympning, som redan sagdt är, samt genom sticklingar, som tagas på våren och sätts under glasklocka.

Datura, L. (*Brugmansia*.) En förändring af dess Arabiska namn *tatorah*. *Pentandria*, *Monogynia* — *Salanæ*.

D. arborea, L. †. H. Mexico. Bl. Sept., Okt. Blom: r hvita, trumpetlika, hängande, 10 till 12 tum långa, välluktande. Bladen stora, äggrundt lansettformiga. Kallas allmänt Trumpet-trädet.

Odling. Öfvervintras vid 6—8° C. utan vattning. Omplanteras i slutet af Mars uti 2 delar grästorfsjord, 2 delar löfjord, 1 del kogödsel och $\frac{1}{4}$ grof sand. Krukorna eller baljorna tagas stora och i botten lägges ett godt underlag af skärfvor. Utsättes under högsommaren tvenne månader i fria luften på ett solrikt och lugnt ställe, vattnas flitigt och spritas hvarje afton, emedan knappast någon växt är mera utsatt för den röda spinn (*Acarus*) än denna. Inflyttas i Augusti i ett solrikt fönster med fortsatt