

under alla tider af året. Mycket berömda äro de så kallade Dverg-nejlikorna, *D. Caryophyllus var. nanus fl. pleno* från Verviers. Denna afdelning är den nyaste och först beskrifven af Professor Morren i Belgique Horticole.

D. plumarius, L. 2. (Fjäder-nejlika). H. Europa. Bl. Juni, Juli. Blom:r ljusröda med hvitt, välluktande. Bladen mycket smala, jemnbreda, blågröna. Härutaf gifvas äfven flera varieteter; isynnerhet är en att recommendera, benämnd *Anna Boleyn*, som icke bör saknas i någon blomstersamling.

D. scoticus, ? 2. Hybrid från Skottland. Bl. Vår och Som:r. Blom:r rosenröda med purpurröda teckningar, välluktande. Blad som föregående art. Är mycket låg och passar särdeles väl till infattning af rabatter, grupper m. m. på fria jorden.

Odling. Öfvervintras med ringa vattning frostfritt vid 2—4° C. bakför andra växter. Omplanteras i Mars uti 2 delar lerig grästorsfjord, 1 del löfjord, 1 del välförmultnad hästgödsel, $\frac{1}{8}$ krossade ostronskal och kalkgrus och $\frac{1}{4}$ sand. I krukorna sörjes för godt vattenaflopp. Efter omplanteringen flyttas de nära glaset, och temperaturen höjes till 10—12° C. med måttlig vattning. Under sommaren kunna de utsättas i fria luften; äro de i blomma, böra de skyddas mot den starkaste middagsolen och häftiga regnskurar med en skärm af buldansväf. Förökningen sker dels genom sticklingar, som tagas på våren och sättas under glasklocka, dels genom afläggare. Dessa göras i början af Augusti, och huru detta tillgår, se § Förökning i allmänhet.