

190

utgående från stammen, styfva, jembredt lansettformiga, i ändarna försedda med hårda spetsar.

Y. gloriosa, L. 5. H. Canada. Bl. Juli—Sept. Blom:er hvita, utvändigt purpurrodt strimmiga. Bladen som på föregående art, utgående från stammen, lansettlika eller svärdsformiga, blågröna, i ändarna försedda med hårda, sylformiga spetsar.

Odling. Öfvervintras vid 10—12° C. med sparsam vattning. Omplanteras i Mars uti 2 delar grästorfsjord, 1 del löfjord, 1 del hästgödsel och $\frac{1}{2}$ del grof sand. Krukorna tagas tillräckligt stora och förses i botten med ett godt skärf-underlag. Utsätts under sommaren i fria luften på ett solrikt ställe. Förökas genom rotskott, som vanligen först utslå, sedan växten blomstrat.

Z.

Zauschneria, Presl. Till ära för botanisten Zauschner. *Octandria*, *Monogynia*. — *Oenotheraceæ*.

Z. californica, Presl. 2. H. Californien. Bl. Som:er och Höst. Blom:er ljust skarlakansröda. Bladen äggrundt lansettformiga, sågtandade, mjukhåriga.

Odling. Öfvervintras vid 6—8° C. nära glaset med måttlig vattning. Omplanteras i Mars uti 2 delar grästorfsjord, 2 delar löfjord, 1 del ljungjord och $\frac{1}{4}$ sand. Utsättes under sommaren i fria luften. Blomstrar och trivses bäst, om den utplanteras i fria jorden på rabatter eller blomstergrupper. Förökas genom sticklingar, som lätt fatta rötter under glasklocka.

