

Ögonen icke håriga; hufvudet måttligt tillbakadraget och mindre hårigt än hos föregående art; kroppen väsendtligt smärta- re än hos *Anartorna* i allmänhet.

Från sina närmaste samslägtingar *An. Richardsoni* och *Schönherrri* afviker denna art genom dunklare och mera enfor- mig färgton, stötande något i gult, på framvingarne undertill och på både öfre och undre sidan af bakvingarne. Hufvudformen har ock ofta mycket gult inblandadt ofvantill på framvingarne. Från *Richardsoni* skiljes den lätt genom sina glatta, icke håriga ögon, genom storleken och genom formen på det af den främre och bakre tvärlinien på framvingarne ofvan bildade fältet, som hos denna art är föga smalare vid vingarnes inkant än utkant; från *Schönherrri* torde den lättast skiljas genom mera framdraget huf- vud och genom kroppsformen.

9. *Anarta lapponica* (THUNB.).

Alis anterioribus supra grisescentibus, plus minusve ni- gro-variegatis; subtus nigricantibus, plus minusve albo-mixtis, macula media nigra distincta sed parva fasciaque, inter hanc maculam mediam et marginem posteriorem sita, alba ornatis; alis posterioribus supra, fere totis, nigro-fuscis, margine exte- riore angustissime fasciaque plus minusve distincta pone me- dium cinereo-albicantibus; subtus nigricantibus, paullo albo- mixtis, macula media nigra distincta sed parva, fascia sat lata pone medium alba L. al. exp. 25—26 mill.

Noctua lapponica THUNBERG, Diss. ent. Ins. suec., pars 2, pag. 42, fig. 10 (1791).

Anarta Amissa LEFEBVRE, Ann. Soc. ent. de France, tom. 5, pag. 397 ♂, tab. 10, fig. 6 (1836). — DUPONCHEL, Hist. nat. Lep. de France, suppl. tom. 3, pag. 598, tab. 49, fig. 7. a. — HERRICH-SCHÄFFER, Syst. Bearb. Schm. Eur., Bd. 2, pag. 372, tab. 42, fig. 211—12 (1846). — STAUDINGER, Stett. ent. Zeit., Jahrg. 18, pag. 293 (1857).

» *melanopa* var. *b* ZETTERSTEDT, Ins. lapp., pag. 950 (1840), sec. ex. typ. in museo Lundensi.