

höjderna. Den 24 juli 1 st. vid telefonstolpe 105 och 1 st. vid telefonstolpe 73 på vägen Skalstugan—Sandviken i Norge.

Trädpiplärka (*Anthus trivialis*). Tämligen allmän i skogsområdet.

Nordiska Gulärlan (*Motacilla flava thunbergi*). Förekom tämligen allmän på passande lokaler. De höllo sig gärna intill byggnader och satte sig även på dessa liksom sädesärlan och tillsammans med denna.

Sädesärlan (*Motacilla alba*). Ringärla Förekommer vid gårdarna samt vid vattendrag med någon gammal byggnad, dock ej på alla gårdar.

Såg ungfåglar vid Melen samt fann bo med ägg den 21 juni i kanten av rökhålet till en gammal lappkåta vid Mansjöns östra ände, 541 m. över havet.

Lappmesen (*Parus cinctus*). Teta. Blott ett par iaktogs vid Åbo den 7 juni med mat i näbben, varför de givetvis häckade på platsen.

Talltitan (*Parus atricapillus borealis*). Teta. Förekommer tämligen allmänt över hela skogsområdet. Endast en unge märkt vid Skärrvattnet, Åbo den 17 juni.

Vanliga Törnskatan (*Lanus collurio*). Ett häckande par iakttaget på Flanderstöten, där 4 ungar märktes den 5 juli.

Grå Flugsnapparen (*Muscicapa ficedula*). Iakttagen blott en gång på Åbo vid Korsvattnet den 6 juni.

Svart och vit Flugsnappare (*Muscicapa atricapilla*). Förekom mycket sparsamt, man kan nästan säga sällsynt. Två par iakttogos, det ena invid Skalstugan och hade det ägg därstädes, det andra mellan Åbo och Melen. En fågel, så lätt att lägga märke till, borde hava upptäckts, ifall den varit mera allmänt förekommande i trakten.

Lövsångaren (*Phylloscopus trochilus*). Mycket allmän i skogsområdet och på myrarna. Iakttagen så gott som varje dag, där blott någon skogsvegetation fanns. Den lilla sången ljud ideligen dagen lång. Häckande i slutet av juli lite överallt. 13 märkta den 5 juli 1928. 7 st. norr om V. Kjolsjön.