

kommo några par samt på Skalstugans marker lite här och var. 1 st. märktes den 16 juli på Finnvalen, Åbo. Den 9 och 10 aug. sågos både gamla och unga rödbenor vid Ö. Ottsjön, senare besöktes ej några lokaler, där rödbenor plåga vistas.

Grönbena (*Totanus glareola*). Myrsnip. Förekom rätt sparsamt. Iakttogs på Skalstugan i några fall samt på Åbo. Vid Lill-Melen.

Drillsnäppan (*Tringoides hypoleucos*). Strandola. Mycket allmän. Blott vid Summelsjön på Åbo hittades 3 bon den 17 juni och innehöllo då 2 av dem 4 ägg samt det tredje 2 ägg. Vid denna sjö voro minst 8—10 par häckande. Samma datum hittades i Finntjärnarna även ett bo med ägg. Den 29 juni 4 ägg St. Rensjön. Den 29 juni funnos nykläckta ungar, Åbo, samt den 29 juli flygga ungar. Drillsnäppan förekom vid alla sjöar med flera par samt även vid älvarna och de större tjärnarna. 9 st. märkta. Mellan 2 och 16 juli märktes 4 st. vid Summelsjön, Åbo, samt den 20 juli 1 st. på Skalstugan vid en bäck och 1 st. den 27 juli vid Sansjön. Ungarne voro ofta nedkrupna i lemmelhål eller bland trädrötter i strandkanterna.

Kärrensäppan (*Tringa alpina*). Iakttagen på Godön i ett exemplar i början av juni, sannolikt var den stadd på flyttning.

Dubbelbeckasinen (*Gallinago media*). Beckasin. Förekommer allmänt på lämpliga lokaler. En synnerligen lämplig terräng är på Skalstugans marker på gränsen till St. Rensjön och Saxvallen. Ett bo med övergivna ägg fanns på Skalstugan den 28 juni och en unge, nästan flygfärdig, märktes den 25 juli. Den 30 juli funnos på V. Kjoland bon med 4 ägg. Vid Monsjön och Ottsjöarna, på Sägens marker var även lämplig terräng. Dunungar hittades vid N. Ottsjön, två märktes.

Enkelbeckasinen (*Gallinago gallinago*). Njeckergauk. Ungefär samma utbredning som dubbelbeckasinen. Skalstugans marker voro särskilt lämpliga även för denna. Men som denna beckasin ju ej är så nogräknad på terrängen, fanns han ju litet över allt. På Skalstugan hittades en vecka gamla ungar samt bo med 4 ägg den 26 juni 1928. Den 27 juli