

(plerocercoider) av densamma i fyra olika arter av matfiskar Lake Superior och Portage Lake i Michigan. Genom utfodringsexperiment på hundar har han fastslagit dessa larvers rätta natur. Bl. a. hade han påträffat dylika bandmasklarver i gös. Då emellertid en stor del av den gös, som förtäres i Förenta Staterna, importeras från Canada, uppstod hos honom den misstanken, att även därifrån skulle kunna komma bandmasklarver, som infekterade människor. Detta visade sig också vara fallet. I 25 gösar från Lake Winnipeg träffades 5 plerocercoider och i en annan sändning av 20 gösar från samma sjö 1 dylik. Genom utfodring till hundar bevisades, att de tillhörde den breda bandmasken. Undersökningarna utsträcktes sedan till fiskar från andra sjöar i Canada och larver av breda bandmasken påträffades i gösar och gäddor från Lilla Slavsjön, Lake Manitoba, Lac la Biche m. fl. sjöar. I vissa sjöar syntes infektionen mera allmän. I 25 gösar från Lake Nipigan påträffades t. ex. 53 plerocercoider och i 4 gäddor »åtminstone 147». Genom fiskexport från dessa sjöar framkallas bandmaskinfektioner i olika trakter av Förenta Staterna, även så avlägsna som Boston, Milwaukee m. fl. Den citerade förf. framhåller, att många av nybyggarna vid de sjöar i Canada, från vilka fisk skickas till Staterna, härstamma från länderna kring Östersjön och att det sannolikt är genom dem, som den breda bandmasken inkommit. Här i Sverige träffas den breda bandmaskens larver som bekant bl. a. i gädda, lake, siklöja, aborre o. s. v., men genom ordentlig kokning eller stekning dödas de naturligtvis, så att därigenom infektion lätt kan förebyggas.

E. L.

Till kännedomen om den rödhalsade gåsens, *Branta ruficollis*, förekomst i Europa.

Med anledning av artikeln om vårt senaste fynd av denna fågelart skriver den ungerske ornithologen Dr. N. VASVÁRI till redaktionen och meddelar, att den rödhalsade gåsen sedan 1915 visat sig rätt regelbundet i Ungern även på andra ställen än Puszta Hortobágy och t. o. m. i västliga delar av landet. Under de senaste 13 åren tror han, att tillsammans omkring 20 dylika blivit skjutna, varjämte naturligtvis också åtskilliga blivit sedda. Ibland har man sett små flockar, men mestadels voro de rödhalsade gässen i sällskap med bläsgässen, såsom yttrades i vår uppsats. I nov. 1928 nedlades i fem komitat »åtminstone 7 ex.». Om dessa hade naturligtvis ännu ej något meddelande hunnit hit, då uppsatsen trycktes, och då där uttalats, att mer än ett dussin skjutits, stämmer ju detta utmärkt bra. I Siebenbürgen sköts det första kända exemplaret vid Hermannstadt i slutet av nov. 1928. Slutligen har även ett ex. skjutits i Dobrudscha i Rumänien i sept. 1928 av greve K. KORINS. I Bulgarien skall på senare tid enligt Dr. VASVÁRI även den rödhalsade gåsen ha iakttagits. Han omtalar även ett par fynd i Egypten från 1880-talet. Totalbilden blir dock densamma, nämligen att sannolikt ifrågavarande fågelart på senare tid fått en något västligare riktning på sin flyttning.