

de 20 april.) Något par brukar då årligen ses i Skatt-träsket. Så snart småtjárnarna blivit isfria, flytta paren till sina resp. boplatser, vilka alltid varit belägna vid mindre tjárnar, så ensligt liggande som möjligt. I slutet av maj eller början av juni är äggkullen fullagd. När kläckningen skett, vandrar familjen från tjárn till tjárn. Vid jakttidens början äro ungarna i allmänhet flygga. Det har dock inträffat, att ej flygfärdiga ungar påträffats vid denna tid. Familjen börjar nu föra ett mera kringflackande levnadssätt. Ungarna skingras och flytta vanligen till de större sjöarna, där de erhålla bättre skydd mot skytte. I slutet av september eller början av oktober, då sjöarna börja isbeläggas, flytta fåglarna söderut. (I slutet av oktober återfinnas ungfågeln i Skåne, de äldre först då sträng vinter inträder.)

Detta år hade ett par varit synligt i Skatt-träsket i mitten av maj, ett annat i Krokittjárn i slutet av månaden. Blott vid tvenne tillfällen såg jag salskrakar på orten, nämligen ett par i Skatt-träsket den 7 juni samt en hona i närheten av Sandberget den 16 juni. Ehuru alla knipstånkor i trakten undersöktes och dessutom den bästa terrängen systematiskt genomgicks stod intet bo att uppleta. Det kan emellertid med någorlunda sannolikhet antagas att även detta år ett eller möjligen två par häckat därstädes.<sup>1</sup>

Den 21 juni fortsatte vi resan via Arjepluog till Loholm, beläget vid norra stranden av Aisjaure, bisjö till Hornavan. Norr om Aisjaure utbreder sig ett vidsträckt låglandsområde, sträckande sig upp mot Laisvik vid Hornavan. Detta låglandsområde är till större delen bevuxet av barrskog. Björkinblandningen är dock mera påfallande än vid Skatt-träsk. På myrarna växa rikligt med vide och dvärgbjörk. I väster och öster begränsas låglandet av björkskogsbeklädda höjder. I fjärran syntes de snöklädda topparna av Peljekajse och Titjak. Ur såväl zoologisk som botanisk synpunkt visade sig området

<sup>1</sup> Enl. ett i häft 6, 1928, av denna tidskrift gjort meddelande har salskraken i sommar häckat i Glommersträsk, beläget endast c:a 1/2 mil från undersökningsområdet.