

på en så sydlig plats som häckfågel anträffade vadare. Efter några timmar hade jag funnit 2 kullar späda dunungar. Det var, som känt är, endast hannen som vårdade sig om ungarna. Svartsnäppan befanns vara allmän här egendomligt nog. Inom ett område av några km. radie uppehöll sig åtminstone sju kullar.

Den 27 juni lämnade vi Loholm för att fortsätta färden till Laisvall vid Storlaisan, där vi slog läger. De följande 10 dagarna ägnade vi åt studiet av lågfjällspartiet väster om Storlaisan, varefter vi återvände till Skatt-träsk, där vi under en veckas tid sysslade med ringmärkning, fiske m. m.

Detta år rådde tyvärr så gott som fullständig brist på våra periodiska gnagarearter. Under tvenne dagar, då snö betäckte marken, såg jag ej ett spår av sorkar. Som en följd härav var det ont om de av dessa gnagare beroende rovfåg-larna. Hökugglan, *Surnia ulula*, t. ex. som de flesta år tämligen allmänt häckar i utsatta knipholkar, tycktes i sommar vara totalt försvunnen.

För att kunna ge en så fullständig bild som möjligt av vertebratfaunan i Skatt-träskområdet skall jag slutligen i nedanstående tabell lämna en kort översikt över denna, dels grundad på egna iakttagelser och dels på förutnämnda personers uppgifter, vilkas tillförlitlighet jag oupphörligt hade tillfälle att kontrollera. EDVIN GRUBBSTRÖM kände ej blott till de flesta fågelarternas utseende och häckningsvanor utan kände även deras läten, vilka han ofta mäterligt efterhärmade.

Nomenklatur efter E. LÖNNBERG, Sveriges ryggradsdjur.<sup>1</sup>

Artnamn	Egna iakttagelser	Erhållna uppgifter
<i>Sorex spec.</i>	—	Hittas ofta döda på vintervä-garna.
<i>Neomys fodiens</i>	Ett ex. i Skatt-träsk.	Allm. i Baktsjaure (Gm).
<i>Pipistrellus nilssonii</i>	(Se ovan). Täml. sälls.	—
<i>Vulpes vulpes</i>	—	Sparsam, ivrigt jagad.
<i>Lutra lutra</i>	—	» lya i Skattån (Gm).

<sup>1</sup> Följande förkortningar användas i tabellen: E. GRUBBSTRÖM = (Gm), H. LUNDBERG = (Lg). Saknas uppgift om sagesman äro meddelandena sam-stämmiga. Iakttagen häckande = h.