

alltid säker om att träffa en mörk art af samma slägte.

Ännu några märkliga, från skalbaggar hemtade exempel, på efterhärming efter andra föremål förtjena att här anföras. Bland de granna Buprestidernas familj finnes det i Orienten några små arter af slägtet *Coroebus*, som vanligen sitta på bladens midtribbor, och hvilka till den grad likna färsk fogelträck, att den samlande naturforskaren ofta betänker sig, innan han tar dem. KIRBY och SPENCE omtala en liten skalbagge, som liknar fröet af en växt ur familjen Umbelliferæ. En annan liten skalbagge kan enligt BATES knapt skiljas från träck af fjärillarver, under det andra i följd af sin halfklotsform och guldfärg likna glänsande dagdroppar på bladen o. s. v. En del små bruna och fläckiga skalbaggar släppa sig ned från det blad, hvarpå de sitta, och ega förmågan att så draga in sina antenner och ben i därtill bestämda fördjupningar, att dessa ej synas, utan insekten förvandlas i hast till en brun, orörlig klump, som man näppeligen skall lyckas igenkänna bland markens småsten och jordklumpar.

Men fjärilarnas färgfördelning är kanske ännu mer upplysande i detta hänseende. Dagfjärilarna hafva nämligen sina glänsande färger på ryggsidan af alla fyra vingarna, hvaremot dessas undre yta nästan alltid har mycket mattare och enklare färg, ofta mörk med otydliga teckningar. Nattfjärilarnas hufvudsakliga färg finnes däremot vanligen endast på bakvingarna, under det framvingarna hafva matta, dunkla färger, som ofta likna andra föremål, och de dölja i allmänhet bakvingarna under hvila. Dagfjärilar-