

lysen viser forholdsvis Rigdom paa Kvælstof, men nærmest Trang paa Fosforsyre og Kali, saa har dog en Gjødning med blot Fosforsyre og Kali kun givet en ringe Forøgelse i Haudbytte og i økonomisk Henseende endog et Tab; i endnu højere Grad var dette Tilfældet med blot Fosforsyre og Kvælstof.

Gjødning	Kg. Ho pr. Rude à 1 ar	Kg. Ho gjennem- snitlig pr. 10 ar	Meravling sammen- lignet med ugjødslet Kg. pr. 10 ar	Meravlingens Salgsverdi pr. 10 ar 1 kg. Ho = 6 Øre	Nettogevinst (+) eller Tab (-) Kroner pr. 10 ar
Intet	38 35 37,5	368	—	—	—
Chilispeter Superfosfat Kainit	59 57,5 63,5	600	232	Kr 13,92	+ 5,96
Superfosfat Kainit	39 41,5 41	428	60	3,60	- 1,96
Chilispeter Kainit	48,5 51 49	495	127	7,62	+ 2,06
Chilispeter Superfosfat	42,5 39,5 41	408	40	2,40	- 4,00

At Forholdet under andre Omstændigheder kan falde anderledes ud er selvfølgeligt, og illustreres godt ved de af *Søberg* offentliggjorte mange Exempler.

I Aarene 1903—5 udførtes ialt 163 Overgødsningsforsøg med følgende Resultat pr. 10-ar i Kroner:

Gjødning	1903			1904			1905			Antal Tilfælde pr. 10- ar
	Netto-Udb. gjennemsn. Størst	Netto-Udb. Størst	Netto-Udb. Netto-Tab	Netto-Udb. gjennemsn. Størst	Netto-Udb. Størst	Netto-Udb. Netto-Tab	Netto-Udb. gjennemsn. Størst	Netto-Udb. Størst	Netto-Tab	
N, K ₂ O, P ₂ O ₅ . . .	4,62	17,45	1,80	4,53	16,90	9,75	2,65	10,29	3,85	18
K ₂ O, P ₂ O ₅ . . .	0,30	12,50	8,75	2,55	14,85	3,00	0,20	6,55	3,25	65
N, K ₂ O . . .	2,62	17,20	6,30	3,17	15,60	4,95	1,20	8,55	4,05	40
N, P ₂ O ₅ . . .	4,02	16,70	1,55	4,08	13,82	5,05	2,45	8,00	2,85	54