

Meter over Havet. På det sydlige Norges Høisletter levere disse Buske det til Sætedriften fornødne Brænde.

Som Representant for Vegetationen følger derefter Græs og Halvgræsarter, og tilsidst Lichener.

De jævne Flader af det sydlige Norges store Fjeldvidder bestå forøvrigt dels af Moræser og Myre, undertiden bedækkede af Molter, dels af Græsletter, der tildels benyttes til Slåt af Hø, som om Vinteren, når Sneen har banet Vei, føres ned til Dalbygden, men væsentligst til Sætedrift og til Slagtedrifter, enkelte Steder også til Hestenes Opfodring og Avl. Ea stor Del af Høisletterne og Fjeldvidderne består dog af tør Lav, navnlig Renlav og islandsk Lav, (*Cladonia rangiferina* og *Cetraria islandica*), og af nøgne Klippeflader, ofte bedækkede af store Stenare.

Norges Folkemængde

anslås for Året 1665 ifølge et dengang optaget temmelig detaljeret Skattemandtal til 460000 Mennesker.

Den udgjorde ifølge Folketællingerne*) af 15 August	730000	—
1769	730000	—
1 Februar 1801	885000	—
30 April 1815	918000	—
27 Novbr. 1825	1068000	—
29 — 1835	1212000	—
31 Decbr. 1845	1340000	—
31 — 1855	1505000	—
31 — 1865	1705000	—
31 — 1875	1817000	—

Den årlige Tilvæxt fra 1815 til 1865 har således i Gennemsnit været $1\frac{1}{4}$ pCt. årlig, en Tilvæxt, der er større end i noget andet europæisk Land.

*) De umiddelbare i Folketællingerne angivne Tal ere noget korrigerede efter Opgaverne af Fødsle og Døde.